捕球動作時の手首の屈筋
に見られる反射性筋放電

所属学科目 体力学

著者名 柳原大

論文指導教員 石田 絢子

合格年月日 昭和63年2月18日

論文審査委員

青木 純一郎
星野 義夫
星野 公夫

目次										
										頁
第 1 章	緒言									1
第 2 章	関連文献の考証									6
第 1 節	伸張反射について									6
第 2 節	M 2 を皮質経路の反射として									8
	考察した文献									
第 3 節	M 2 生成の起因を末梢の機構									13
	に求める文献									
第 4 節	伸張反射の機能的意義に關す									16
	る文献									
第 5 節	伸張反射と学習									19
第 6 節	誘発筋電図について									23
	(1) H 反射の基本的な性質につ									23
	いて									
	(2) H 反射を利用して行われた									25
	研究に關する文献									
第 3 章	実験方法									31
第 1 節	被験者									31
第 2 節	実験手順									31

第 3 節	ボ ー ル 落 下 装 置 及 び 捕 球 動 作	3 3
	の 記 録	
(1)	ボ ー ル 落 下 装 置	3 3
(2)	捕 球 動 作 の 記 録	3 3
第 4 節	筋 電 図 の 記 録	3 5
第 5 節	分 析 方 法	3 6
(1)	捕 球 動 作 時 の 筋 電 図 の 分 析	3 6
(2)	捕 球 動 作 時 の 手 首 の 動 き の	3 9
	分 析	
第 6 節	誘 発 筋 電 図	3 9
(1)	H 反 射 の 誘 発 及 び 記 録 方 法	3 9
(2)	H 反 射 の 同 定 及 び 分 析 方 法	4 2
第 4 章	実 験 結 果	4 5
第 1 節	捕 球 動 作 時 に 出 現 し た 反 射 性	4 5
	筋 放 電 (M 1、 M 2) に つ い	
	て	
第 2 節	反 復 経 験 に よ る M 1、 M 2 の	4 5
	変 動	
第 3 節	M 1、 M 2 の 変 動 と 脊 髄 の α	4 8
	運 動 ニ ュ ー ロ ン プ ー ル の 興 奮	

第 1 章 緒 言

骨 格 筋 が 急 速 に 受 動 的 に 伸 張 さ れ る と、 一
 定 の 潜 時 の 後、 そ の 筋 は 収 縮 す る。 こ れ は 伸
 張 反 射 と し て 知 ら れ て い る。^{29) 41) 44)} そ の 際、 筋 電 図
 を 記 録 す る と、 短 い 潜 時 で 筋 放 電 活 動 が 認 め
 ら れ る こ と も 既 に よ く 知 ら れ て い る。^{16) 17) 18) 33) 34) 67)}

反 射 運 動 と 随 意 運 動 と は 一 般 に よ く 比 較 さ
 れ る。 反 射 運 動 と は 生 体 の 内 外 か ら 加 え ら れ
 る 刺 激 に 対 し て 固 定 的 な 活 動 パ タ ー ン で 応 じ
 る も の、 一 方、 随 意 運 動 と は そ れ 以 外 の 筋 運
 動 と 言 う べ き も の で、 1) 刺 激 に 対 し て 固 定 し
 な い 活 動 パ タ ー ン で 応 じ る 運 動、 ま た は 2) 刺
 激 が な く て も 起 こ る 運 動 で あ る と 久 保 田 (1 9 8
 4)⁴⁰⁾ に よ っ て 説 明 さ れ て い る。

こ の 固 定 的 な 活 動 パ タ ー ン の み を 有 す る と
 考 え ら れ て い た 反 射 運 動 の 代 表 例 と 言 う べ き
 伸 張 反 射 で さ え 適 応 性 あ る 変 化 を 示 す こ と が、
 最 近 1 9 8 0 年 以 降 に お い て Wolpaw 及 び そ の 共 同
 研 究 者 ら に よ っ て 報 告 さ れ て い る。⁶⁵⁻⁷¹⁾ 彼 ら は、
 外 乱 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ た 伸 張 反 射 の 電 位

の大きさが、初期の値より大きくなるか、あるいは小さくなるかした時報酬を与えるという課題をサルを対象にして毎日3000—6000回課したところ、サルがその伸張反射の大きさを漸進的に変化させ得ることを観察した。この結果から、彼らは、サルで伸張反射の大きさをオペラント条件づけし得ることを示唆している。

Lee と Tatton (1975)⁴²⁾ は、ヒト及びサルでハンドルを握った手首が外力によって受動的に伸展された際に、それに拮抗してできる限り素早く手首を曲げる動作を行わせた時の筋電図を平均加算した電位波形には、三つの peak があることを報告している。これらの peak は潜時の短い順に M 1、M 2、M 3 と命名され、これらの起源について、彼らは、M 1 は脊髓における単シナプス性の伸張反射、M 2 は大脳皮質経由の反射、M 3 は随意性の補正運動によるものと提唱している。Colebatchら(1979)⁹⁾、Lee と Tatton (1975)⁴²⁾ は、ヒトにおいて、

外力により上肢筋に伸張を加える際、“抵抗せよ (Resist) ” あるいは “ 従え (Let go) ” などの予告指示を与えた時、M 2 の大きさが修正されたということを報告している。

さらに、Christakosら⁸⁾ (1983)、Meyer-Lohmannら⁵⁾ (1986)は、肘の屈曲及び伸展を行っている最中にランダムに外乱を加えるという課題において長期間のトレーニングの影響を同一のサルで約4年間にわたり研究し、以下の結果を得た。つまりM 2は次第に小となり、しまいには消失したが、一方M 1はその大きさが次第に増大したことを示した。彼らはこの結果について、大人のサルの感覚一運動系についての長期間にわたる可塑性を証明するものであると述べている。

上記のWolpawら、Christakosら、Meyer-Lohmannらの報告より、ある運動課題により反射性筋放電として生ずるM 1及びM 2の大きさは、ヒトの場合でもその課題を反復的に経験することによって変化するもので

あ ろ う こ と を 予 想 さ せ る 。 し か し 、 従 来 の 研
 究 の 結 果 は す べ て サ ル の 場 合 で 、 ヒ ト に つ い
 て の 研 究 は 見 あ た ら な い 。 さ ら に こ れ ら の 研
 究 で は 、 四 肢 の 単 関 節 の 屈 曲 ・ 伸 展 と い う 極
 め て 単 純 な 動 作 を 対 象 に し て お り 、 実 験 状 況
 が か な り 人 為 的 で あ っ た 。 し た が っ て 、 こ れ
 ら の 研 究 の 結 果 を そ の ま ま ヒ ト が 実 際 に 行 っ
 て い る 運 動 に 適 用 し て 考 え て も 良 い の か と い
 う 疑 問 が 生 ず る 。
 そ こ で 、 本 研 究 で は 、 そ の 動 作 が 随 意 的 で
 自 由 な 活 動 状 況 下 に あ り 、 ま た 実 際 の 運 動 形
 態 に な る べ く 近 い 動 作 で の 反 射 性 筋 放 電 に つ
 い て の 検 討 を 行 い た い と の 意 図 か ら 、 被 験 者
 に 垂 直 落 下 し て く る ボ ー ル を 捕 球 す る 運 動 動
 作 を 課 し た 。 そ し て そ の 際 の 手 首 の 受 動 的 な
 伸 展 に よ る 反 射 性 筋 放 電 に つ い て 以 下 の 点 を
 主 と し て 検 討 し た 。 捕 球 動 作 時 に 、 M 1 及 び
 M 2 に 相 当 す る 反 射 性 筋 放 電 が 見 ら れ る か 、
 ま た 、 そ の 動 作 を 反 復 的 に 実 行 し 、 経 験 を 積
 む こ と に よ っ て そ れ ら の 反 射 性 筋 放 電 の 大 き

れば、ヒトの前腕の屈筋において、これらの peak の潜時は、最初のものが、28 - 32 msec、2番目のものが55 - 60 msec、3番目のものが85 - 95 msecであり、これらの peak は潜時の短い順に M 1、M 2、M 3 と命名された。これらの起源について彼らは、M 1 は従来から知られていた脊髄における単シナプス性の伸張反射、M 2 は大脳皮質を経由する Long loop reflex、M 3 は随意性の補正運動によるものと提唱した。

現在までに M 2 に関する研究は、多くなされてきているが、その起源についての見解は必ずしも一致していない。それらの研究は、M 2 を大脳皮質経由の反射として考察した報告と M 2 が大脳皮質経由の経路を必要とせず、脊髄内機構で説明し得るとする報告に大別される。そこで前者の報告を後述の第2節で、後者の報告を後述の第3節で考証した。

第 2 節	M 2 を皮質經由の反射として考察し
た文献	
M 2 が大脳皮質經由の反射として考えられ	
た理由は以下のようなことである。	
1) 運動野ニューロンが外乱に対応して活	
動すること。 ¹²⁾¹¹⁾²³⁾²⁴⁾²⁶⁾	
M 2 が皮質經由の反射であるとするれば、そ	
の必要条件として筋紡錘からの情報が大脳皮	
質に達していなければならぬ。Phillipsら	
(1971) ⁵⁶⁾ は、サルを用いた動物実験で大脳皮質	
体性感覚野のニューロンに筋紡錘からの情報	
が達していることを示した。Everts(1973) ²³⁾ ,	
EvertsとFromm(1981) ²⁴⁾ , EvertsとTANJI(1976) ²⁶⁾	
は、大脳皮質運動野の錐体路ニューロンが筋	
の受動的な伸張により発射頻度の増加を示し	
たと報告している。さらに、Conradら(1974) ¹⁰⁾	
, (1975) ¹¹⁾ は、運動野ニューロンが筋電図で観	
察されたM 2に一定の時間差を持ってその発	
生に寄与するよう先行して活動していたこ	
とを発見した。またこの際の運動野ニューロ	

ンの活動は二つの成分 (early response, late response) に分けられた。early responseはM 2を、late responseはM 3を引き起こすものと考えられた。また Ewarts (1973)³³⁾ は外乱から運動野の錐体路ニューロンの活動までの潜時と運動野の錐体路ニューロンの発火から筋活動電位が生じるまでの潜時を測定したところ、前者が25 msec、後者が7 msecでその合計が32 msecとなり、M 2の潜時(30 - 40 msec)とほぼ等しいことを示した。

2) M 2の潜時は、筋と大脳皮質間の距離によって変化し、その距離が長い下肢の筋で潜時が最も長いこと。⁴⁶⁾

Chanら (1979)⁴⁷⁾ は、上腕二頭筋、大腿四頭筋、腓腹筋について、M 2の潜時を調べ、上腕二頭筋においてもっとも潜時が短く、頭部より最も遠い腓腹筋で最も潜時が長いことを報告した。Marsdenら (1976)⁴⁶⁾ は、顎の屈筋、前腕の長母指屈筋、下腿の長母趾屈筋について、M 1とM 2の潜時の差を中枢性の伝導時間と

して求めた。M 2 が大脳皮質經由の反射であるならば、中枢性の伝導距離、つまり大脳皮質とそれぞれの筋を支配する脊髄の運動ニューロンまでの距離が長い筋の方がこの時間は長くなるはずである。結果として長母趾屈筋でこの時間が最も長く、顎の筋で最も短いことが示された。

3) M 2 は動作の予告指示 ('Let go', 'Resist') によって影響を受け、その電位の大きさが変化したこと。⁴⁾⁹⁾³⁴⁾⁴²⁾⁴⁵⁾⁵⁷⁾

Hammond (1956)³⁴⁾, Lee と Tatton (1975)⁴²⁾, Colebatch ら (1979)⁹⁾ は、ヒトで上肢の筋が外力により伸張される際、その外乱に対して "抵抗せよ (Resist)" あるいは "従え (Let go)" などの予告指示を被験者に与えた時、M 1 の大きさはほとんど変化しなかったが、M 2 の大きさが著しく変化したと報告している。これらの報告において、M 2 の大きさは被験者が "抵抗せよ" と指示された時に非常に大きくなり、"従え" と指示された時には、

何も指示されなかった時よりもやや小さくな
ったことを示している。つまり、M2の電位
は大脳の活動の影響を受け、M1とは著しい
差異があることが示された。

また Rothwell⁵⁷⁾ら(1980)は、長母指屈筋と上
腕二頭筋を被験筋として予告指示の影響を調
べたところ、その影響は上腕二頭筋において
はかなり大きかったが、長母指屈筋において
は小さかったと報告し、予告指示の影響が被
験筋によって異なることを示した。また彼ら
は、予告指示の提示とその後の外乱との時間
間隔がランダムに変えられる時よりも一定で
ある時、すなわち被験者が外乱のタイミング
を予測できる時に予告指示の影響が大きかっ
たことを報告している。

EvartsとTanji²⁵⁾(1974)は、外乱に先行した
予告指示によって外乱に対する反応の方法を
弁別することができるよう訓練されたサル
を被験動物としてその時の運動野のニューロ
ンの活動を観察したところ、外乱によって誘

発された運動野のニューロンの活動が予告指示によって著しく変容されたことを報告している。以上の報告より、M2の電位の大きさは、被験者の外乱に対する随意的な事前の設定（voluntary 'set'）によって修正されることが示され、M2の生成に大脳皮質が関与していることが示唆されている。

4) 脊髓より上位の神経系の傷害あるいは病変によってM2が消失すること。⁴²⁾⁵³⁾⁵⁴⁾⁶¹⁾

Tattonら⁶¹⁾(1975)、LeeとTatton⁴²⁾(1975)は、大脳皮質の一侧の体性感覚野を除去したサルにおいて、その除去した側と同側（正常側）の四肢については、M1、M2、M3とも観察されたが、対側（除去側）肢ではM1とM3は正常側と同様に観察されたけれどもM2は消失していたと報告している。またLeeとTatton⁴²⁾(1975)は、固有受容性のインパルスの上行路である楔状束の傷害を有する多発性硬化症の患者において、M2及びM3が消失していたことを報告している。

Nothとその共同研究者らは、⁵³⁾⁵⁴⁾臨床的に体性感覚誘発電位の振幅が著しく減少された症状を示したハンチントン舞蹈病の患者において、M2が観察されなかったと報告している。以上1) - 4)に示した諸事実よりM2は大脳皮質経路の反射であると提唱された。

第3節 M2生成の起因を末梢の機構に求める文献

一方、M2の起源が大脳皮質経路の経路を必要とせず、脊髄内機構で説明づけられるという報告もある。

GhezとShinoda(1978)²⁸⁾は、M1、M2、M3が除脳ネコ及び脊髄ネコにおいても観察されたことを報告している。⁶³⁾Traceyら(1980)は、頸椎のレベルで脊髄を切断したサルでも、M1、M2が存在したことを示した。さらに、MillerとBrooks(1981)⁵²⁾は、これらの報告をサルを用いた慢性実験で追試し、運動野及び感覚野を破壊した後でも、また除脳及び除小脳

した後でも M 1、M 2、M 3 が存在すること
 を確かめた。これらの報告より、M 2 と M 3
 の生成には M 1 と同様に脳幹より上位は必ず
 しも必要ではないと提唱された。
 Bawa と Tatton (1979) は、M 1、M 2、M 3
 の起因を最終共通路である α 運動ニューロンの
 性質に求めることができると報告している。
 彼らは、手首の伸展時に前腕の屈筋群から表面
 筋電図とともに単一の motor unit (SMU) の
 活動を記録したところ、SMU の 83% は、表面
 筋電図での M 1、M 2、M 3 のどれか一つに
 相当する時間帯にのみ発火していたことを見
 出し、さらに、短潜時で反応する SMU は slow
 twitch motor units としての発火特性を示し、
 長潜時で反応する SMU は fast twitch motor
 units としての発火特性を示したと報告して
 いる。これらの結果より彼らは、M 1、M 2、
 M 3 は α 運動ニューロンの同期した活動を単
 純に表しているのではなく、低閾値の持続的
 に発火する運動単位が M 1 の生成に寄与し、

一方、より高閾値の持続的に発火していない運動単位が M 2 及び M 3 の生成に寄与すると述べている。

さらに、M 1、M 2、M 3 生成の起因を筋紡錘自体の性質に求める報告もある。

Hagbarth³¹⁾ら (1980)、³²⁾(1981) は、ヒトで突然の手首の伸展に対する筋紡錘からの感覚ニューロン (Group Ia fiber) の反応を、正中神経束の中へ挿入されたタングステン微小電極を用いて記録した。その結果、手首の変位により Group Ia fiber の群化された発射が観察され、それらの群化された発射は M 1、M 2、M 3 に時間的に対応していたと報告している。

Hagbarth の共同研究者である Eklund³¹⁾³²⁾ら (1982) は、加速度計を針に取り付け、その針を筋内に刺入し、外乱に対する筋の機械的振動を検出した。その結果、反射性の筋電図反応における M 1、M 2、M 3 などの peak の間隔は筋の機械的振動のものと同様であり、加速度の記録における連続した振れ (deflexions) か

らそれに相当した筋電図の peak までの潜時は
 20 - 25 msec であったと報告している。このよ
 うな結果から、Eklund²²⁾らは M2 が外力による
 衝撃に対する筋の固有振動に対応した筋紡錘
 の第1次終末の反復性の発射により生ずると
 いう 'Resonance theory' を提唱している。

その他、Matthews⁵⁰⁾は、M2 が筋紡錘
 の第2次終末から発する伝導速度の遅い感覚
 ニューロン (Group II fiber) を経由するもの
 であると報告している。また、Dartnall⁵¹⁾ら (198
 5) は、M2 の生成に筋紡錘などの固有受容器
 を必ずしも必要とせず、皮膚の受容器の興奮
 によると報告している。

以上述べたように、M2 の生成に大脳皮質
 経由の経路を必要とせず、その生成は脊髄内
 の機序により説明できるという多数の報告が
 ある。

第4節 伸張反射の機能的意義に関する文献
 筋の伸張などの外乱によって誘発された反

射性の筋活動については、それらがどのような
 目的で存在するのか、あるいはどのような機能
 を担っているのかという目的論及び機能論の
 両面からの考慮がなされている。

短潜時の単シナプス性の伸張反射 (M 1)

の意義は、筋が伸張された時にその筋を収縮
 させ筋の長さを元に戻すこと、つまり筋長を
 一定に保つ働きをすることであると従来から
 言われてきた。²⁹⁾³⁰⁾⁴⁴⁾ Matthews (1972)⁴⁹⁾ は、M 1 によ
 り生ずる張力はその input と output との関係
 において servo-like であると報告している。

ところが、M 2 の機能については、その起
 源が不確定であるのと同様に様々な論議が提
 出されてきている。

Allum (1975)¹⁾ は、ヒトの肩の筋について外
 乱に対する力の応答を調べたところ、M 2 に
 よって発生された力は外乱によって引き起こ
 された変位を補正するために必要とされる力
 の約 15% であり、変位の補正にほとんど貢献
 しなかったと報告している。そして彼は、M

2 は筋に対する負荷の状態を中枢神経系に知らせる信号として機能しているに違いないと述べている。

⁴⁷⁾ Marsdenら(1981)は、ヒトの長母指屈筋において親指の指節間関節の伸展時に出現したM2とその変位の補正にM2が貢献した量を調べた。そして、M2は外乱による変位を完全には補正しないが、5-20度の比較的小さな変位に対しては約50%の補正を提供したと報告している。この結果から彼らは、M2が効果的なservo actionとして、あるいは少なくとも外乱の補正として要求された活動の基礎としての役割を持つと述べている。

⁴⁸⁾ 松波(1984)は、その総説の中でM2の機能について、外乱の補正としての役割は比較的小さく、補正運動に最も重要な役割を持つと考えられるM3を最も早く、最も効率的に働かせるための一種の露払い的な、あるいは、そのために神経系全体をresetさせるreset signalとして働いているのであろうと述べて

い る。

第 5 節 伸 張 反 射 と 学 習

反 射 と は、 受 容 器 の 刺 激 に よ っ て 起 こ っ た 興 奮 が 中 枢 に お い て 意 識 と は 無 関 係 に 変 換 さ れ て 効 果 器 に そ の 効 果 (反 応) を 現 す こ と で あ る と 一 般 に 考 え ら れ て い る。 と こ ろ が、 最 近 の 研 究 か ら、 伸 張 反 射 は 必 ず し も 意 識 と 無 関 係 で あ る と は 言 え な い 事 実 が 示 さ れ て き た。 M 2 に 関 し て は、 前 述 の 第 2 節 の 3) で 記 述 し た よ う に、 そ の 刺 激 (筋 伸 張) よ り 前 に 被 験 者 に 予 告 指 示 を 与 え る こ と に よ っ て、 す な わ ち、 刺 激 に 対 す る 意 識 の 持 ち 方 を 変 え る こ と に よ っ て、 そ の 電 位 の 大 き さ が 変 化 さ れ 得 る こ と が 報 告 さ れ て お り、 こ の 事 は M 2 が 大 脳 皮 質 経 由 の 反 射 で あ る と す る と こ ろ の 強 い 証 拠 と 見 な さ れ た。

M 1 は、 筋 紡 錘 か ら の 感 覚 ニ ュ ー ロ ン と α 運 動 ニ ュ ー ロ ン と の 二 つ の ニ ュ ー ロ ン の み で 構 成 さ れ、 中 枢 神 經 系 の 中 で も 最 も 単 純 な 刺

激一反応の経路であるが、⁴¹⁾このM1について
 も、その電位の大きさが可塑的な変化を示す
 ことが見出されてきている。
 Wolpawら(1983)⁶⁷⁾⁶⁸⁾⁶⁹⁾は、外乱によって引き起こ
 されたM1(spinal stretch reflex; SSR)の
 電位の大きさがある値より大きくなるか(SSR
 ↑ mode)、あるいは小さくなるか(SSR ↓
 mode)した時、報酬が与えられるという課題
 をサルに一日3000-6000試行課したところ、
 実験開始の10日後から37週間後に、SSR ↑
 modeを課せられたサルは、SSRの振幅の一日
 の平均値をコントロール値の140-190%まで
 増大させ、SSR ↓ modeを課せられたサルは、
 コントロール値の22-79%まで減少させたと
 報告している。また、この時の主働筋及び協
 同筋のbackgroundの筋電図活動と初期の筋長
 が変化していなかったことも報告している。
 この結果から、彼らは、M1の学習による
 adaptiveな変化を研究することは、記憶のニ
 ューロンレベルでの研究として重要であり、

半減期をもってゆっくりと減少すること、また SSR mode によって減少された SSR の振幅は一定の変化を示さなかったということを報告している。これらの結果は、2 番目の相が持続性の構造的あるいは物質的变化によって生ずるという考えを裏付けするものであると述べている。

Christakos⁸⁾ら(1983)、Meyer-Lohmann^{f)}ら(1986)は、サルで肘の屈曲及び伸展を行って、いる最中にランダムに外乱を加えるという課題において長期間のトレーニングの影響を約4年間にわたって研究し、以下の結果を得た。つまりその電位の大きさにおいて、M2は次第に小となり、しまいには消失したが、一方M1は漸進的に増大したと報告されている。彼らは、この結果についてサルの感覚一運動系についての長期間にわたる可塑性を証明するものであると述べている。

このように、サルの伸張反射(M1及びM2)の電位の大きさは、可塑性をもち、数千

回あるいは数カ月から数年間の長期間の練習
によって変化することが示されている。

第6節 誘発筋電図について

骨格筋の随意収縮時の筋活動電位を導出、
記録する通常の筋電図に対して、ある特定の
人工的な刺激により誘発される筋活動電位を
導出し記録したものは誘発筋電図と呼ばれて
いる。³⁴⁾ H反射(H-reflex)は、ヒトの脛骨神
経の電気刺激により下腿三頭筋に誘発される
反射性筋活動電位として Hoffmann³⁵⁾(1910)によ
って発見された。H反射という用語は、
Hoffmannの名にちなんで命名されたものであ
る。H反射は、脊髄における単シナプス性の
反射として一般に認められており、脊髄の α
運動ニューロンプールの興奮性を表す指標と
して、生理学、心理学及び臨床上の研究に利
用されている。

(1) H反射の基本的な性質について

H反射の基本的な性質については、既に多

く の 総 説、 解 説 書 に 記 述 さ れ て い る。 被 刺 激
 神 経 に 対 す る 電 気 刺 激 を 弱 い 値 か ら 次 第 に 強
 め て い く と、 刺 激 に 対 す る 閾 値 の 低 い 感 覚 ニ
 ュ ー ロ ン (G r o u p I a f i b e r) が ま ず 興 奮 し、
 脊 髄 の α 運 動 ニ ュ ー ロ ン に イ ン パ ル ス を 単 シ
 ナ プ ス 性 に 伝 達 し、 筋 が 興 奮 し 活 動 電 位 す な
 わ ち H 反 射 が 現 れ る。 H 反 射 の 出 現 後、 刺 激
 を 徐 々 に 強 め て い く と、 H 反 射 の 振 幅 が 次 第
 に 大 き く な り、 ま た、 G r o u p I a f i b e r よ り も
 閾 値 の 高 い α 運 動 ニ ュ ー ロ ン が 興 奮 し、 M 波
 (M u s c l e w a v e) と 名 づ け ら れ た 別 の 波 形 が 出
 現 し て く る。 さ ら に 刺 激 を 強 め て い く と M 波
 の 振 幅 は 次 第 に 増 し て い く の に 対 し て H 反 射
 の 振 幅 は あ る 程 度 の 刺 激 の 強 さ で 最 大 値 を 示
 し、 そ れ 以 上 刺 激 を 強 め る と 振 幅 は 減 じ ら れ、
 つ い に は 消 失 す る。 M 波 の 増 大 に 伴 っ て H 反
 射 が 減 衰 す る こ と の 理 由 は、 刺 激 に よ っ て 発
 生 し た 運 動 ニ ュ ー ロ ン の イ ン パ ル ス は 順 行 性
 に 伝 導 し M 波 を 発 生 さ せ る が、 逆 行 性 に も 伝
 導 し て G r o u p I a f i b e r か ら 運 動 ニ ュ ー ロ ン に

単シナプス性に伝達されたインパルスを途中で
 で遮断するためと考えられている。³⁹⁾⁶⁰⁾ 誘発され
 るH反射の振幅の最大値は単シナプス性に α
 運動ニューロンが興奮した場合の最大の筋電
 図量と見なされ、この値をもつて α 運動ニュー
 ーロンプールの興奮性の指標とすることが一
 般的によく行われている。⁶⁰⁾ またM波の振幅の
 最大値は、その α 運動ニューロンプール内の
 全ての α 運動ニューロンが興奮した場合の筋
 電図量と見なされている。³⁶⁾⁶⁰⁾
 H反射は³⁵⁾ Hoffmannによつて報告された下腿
 三頭筋に限らずこれまで様々な筋で報告され
 ている。前腕の筋では、⁶⁾ Cavallariら(1984)
 , Deschuytereら¹⁵⁾ (1976)が報告している。
 田中⁶⁰⁾ (1986)は、H反射の同定基準として、
 a) 被験筋のその脊髄節までの距離に見合った
 潜時を持つこと、b) 閾値がM波のそれより低
 くなり得ること、c) M波の増大に伴つて減少
 ・消失することの三点をあげている。
 (2) H反射を利用して行われた研究に関

で腓骨筋神経中の Group Ia fiber から抑制性
 介在ニューロンを介してヒラメ筋神経の H 反
 射の回路の一部を抑制するものと考えられて
 いる。また第二の抑制期は、5 - 80 msec の時
 期に現れる抑制で H 反射回路の一部に現れる
 前シナプス抑制に関係あると考えられている。
 第三の抑制期間は 90 - 130 msec で、これは腓
 骨筋神経の刺激で腓骨筋が収縮し足首が背屈
 したために、ヒラメ筋からの求心性活動に変
 化が起きて抑制されたものと考えられている。
 ヒトが反応時間課題を遂行している最中の
 H 反射の振幅の変化を観察し、それをもとに
 して、その反応動作発現の最終共通路である
 α 運動ニューロンの興奮性の変化を調べた報
 告がある。笠井³⁷⁾(1980)は、音刺激に対して素
 早い等張性筋収縮を伴う下肢の底屈あるいは
 背屈反応動作を行わせ、刺激の呈示から反応
 動作開始までの期間に H 反射を記録し、その
 振幅とその時得られた反応時間との関係を検
 討した。その結果として、反応時間は、主働

筋のH反射の振幅と有意な負の相関関係を示し、さらに対側の同名筋のH反射の振幅とも同様な関係を示したことが、ところが、拮抗筋のH反射の振幅とは有意な関係を示さなかったことが観察された。さらに笠井(1981)³⁸⁾は、足首の底屈反応動作を、初期の肢位をいろいろ変化させて追試したところ、H反射の振幅は外旋位で増大し、内旋位で減少したことが、また反応時間も外旋位で最も短く、内旋位で最も長かったことを見出した。

EichenbergerとRuegg(1984)²⁰⁾は、被験者に光刺激に対する足の底屈反応動作を課し、刺激後40-400msecにH反射を記録したところ、H反射が動作の開始前100-160msecの期間に促通されたと報告している。

また、歩行中のH反射を記録した研究が、CapadayとStein(1987)⁵⁾、CrennaとFrigo(1987)¹²⁾によって行われている。その結果として、歩行時のヒラメ筋のH反射の振幅は、スタンス相で大きくなり、スウィング相で小さくな

ることが見出された。

Bulbulian と Darabos (1986)³⁾ は、有酸素的運動によってもたらされるストレスの減少について H 反射を指標として研究している。彼らは、H 反射及び M 波の振幅の最大値 (H_{max} , M_{max}) から H_{max} / M_{max} ratio を求め、その値において低強度 ($40\% \dot{V}O_{2max}$) の運動は運動前の値より 12.8% の減少をもたらし、高強度 ($70\% \dot{V}O_{2max}$) の運動は 21.5% の減少をもたらしたことを報告している。彼らはこれらの結果から、持久的な運動は脊髄の α 運動ニューロンプールの興奮性を減少させるということを示唆した。

Schieppati と Crenna (1984)⁵⁸⁾ は、随意的に等尺性収縮している筋を弛緩させ、活動を停止させるとき、H 反射が著しく抑制されたと報告している。

Delwaide と Toulouse (1980)¹⁴⁾、Toulouse と Delwaide (1980)⁶²⁾ は、ヒラメ筋の H 反射は上肢の筋の随意的な収縮によって促進されること

を報告し、イエンドラシック手技
(Jendrassik maneuver) の生理学的根拠を考
察している。
以上記したように、H反射は生理学的研究
の様々な面で利用されており、今後、体育の
分野においても、運動の調節機序についての
研究を行う際に益々利用されていくものと考
えられる。

第 3 章	実 験 方 法
第 1 節	被 験 者
本 実 験 に お け る 被 験 者 は、 本 大 学 体 育 学 部	
に 所 属 す る 健 康 な 教 員 及 び 学 生 (男 性、 年 齡	
2 0 - 4 3 歳) 1 0 名 で あ っ た。	
第 2 節	実 験 手 順
本 実 験 で は、 被 験 者 に あ る 一 定 の 高 さ か ら	
落 下 す る ボ ー ル を 捕 球 す る 運 動 動 作 を 課 し、	
そ の 際 の 手 首 の 受 動 的 な 伸 展 に よ る 反 射 性 筋	
放 電 を 調 べ る た め に、 ボ ー ル の 落 下 に 関 す る	
条 件 と 捕 球 動 作 を 極 め て 単 純 な 状 況 に 限 定 し	
た。 捕 球 実 験 時 の 被 験 者 に 対 す る 教 示 は 「 で	
き る だ け リ ラ ッ ク ス し、 ボ ー ル が 手 掌 に 触 れ	
る よ り 前 に 手 首 を 動 か す こ と を せ ず、 ボ ー ル	
が 手 に 触 れ た ら そ れ を 強 く 把 握 せ よ 」 と し た。	
被 験 者 は、 シ ー ル ド ル ー ム 内 の 簡 易 ベ ッ ド	
に 仰 臥 姿 勢 に な り、 右 手 を 手 掌 を 上 向 き に し	
て 体 幹 に 直 角 に 差 し 出 し た (F i g . 1) 。	
ま た、 手 の 関 節 の 運 動 の み が ほ と ん ど 束 縛	

なしに随意的に行えるようにし、肘と前腕遠位を固定台上に乗せ、前腕遠位はベルトで固定した。尚、上肢の筋活動が持続性頸反射により影響されないように、被験者は頭部を正中に保持した。このためボールの落下状況は被験者の眼前約1mの位置に設置した鏡を利用して被験者に呈示した。

Fig. 2

実験の手順は、Fig. 2に示すように、50回の捕球動作を1セットとし、それを6セット(B1-B6)、すなわち合計300回の捕球動作を行わせた。このような多数の反復捕球動作は筋活動における反復経験の影響を検討する目的から行われたものである。

1シリーズの実験中では、各試行の間には約10秒から15秒の時間間隔を設け、また各セットの間には約3-5分間の間隔を設けた。このようにして行われた1シリーズの実験の所要時間は、約2時間半以内であった。実験時の気温は約20℃で被験者にとって常に快適な状態で行われた。

第	3	節	ボ	ー	ル	落	下	装	置	及	び	捕	球	動	作	の	記	録					
(	1	)	ボ	ー	ル	落	下	装	置														
ボ	ー	ル	は	直	径	3	.	8	cm	、	重	さ	2	2	5	g	の	鉄	球	を	使		
用	し	た。	特	に	鉄	球	を	使	用	し	た	理	由	は、	a)	電	磁						
的	に	落	下	開	始	を	制	御	で	き	る	の	で	落	下	開	始	を	音				
に	よ	っ	て	被	験	者	が	察	知	す	る	こ	と	を	除	く	こ	と	が				
で	き	る、	b)	鉄	球	に	電	流	を	通	す	こ	と	が	で	き	る	の					
で	落	下	開	始	時	点	を	電	気	信	号	と	し	て	使	用	で	き	る、				
c)	比	較	的	小	型	で	も	落	下	し	て	く	る	鉄	球	の	運	動	エ				
ネ	ル	ギ	ー	に	よ	り	手	首	の	伸	展	を	引	き	起	こ	し、	屈					
筋	の	伸	張	を	実	現	で	き	る	と	い	う	三	つ	の	点	で	あ	る。				
そ	の	た	め	に	電	磁	石	側	に	は	鉄	製	の	ス	イ	ツ	チ	板	を				
貼	付	し	た。	こ	の	落	下	信	号	を	直	流	増	幅	器	(	ダ	イ					
ヤ	メ	デ	ィ	カ	ル	シ	ス	テ	ム	社	製	D	P	A	-	1	0	0	E	の	直	流	増
幅	部	)	に	よ	り	増	幅	し、	デ	ー	タ	レ	コ	ー	ダ	ー	(	エ					
ヌ	エ	フ	回	路	設	計	ブ	ロ	ック	社	製	R	P	-	8	8	0	)	に	記	録		
し	た。	落	下	の	距	離	は	4	0	cm	と	し、	こ	の	高	さ	で	ボ					
ー	ル	が	解	放	さ	れ	て	自	由	落	下	し	手	掌	に	接	触	す	る				
ま	で	の	時	間	は	約	3	0	0	ms	e	c	で	あ	っ	た。							
(	2	)	捕	球	動	作	の	記	録														

捕球動作としては手首の関節運動を記録した。手首の動作には自発的な力によるもの以外に、落下してきたボールの外部的な力による受動的動作が含まれる。それらの動作を解析するためには、動作自体を正確に歪みなく記録する必要があった。このためポテンシヨメーター（コパル社製 J 40 S）を角度変化計として用いた。このポテンシヨメーターは前腕遠位を固定するための固定枠に取り付けられ（Fig. 3, Pot.）、その回転軸を手首の関節の回転軸に合致させた。手首の動きを検出するためにはポテンシヨメーターの回転軸に対して、直径 0.6 cm、長さ 22 cm のスチールパイプを直角に取り付けた。手首の動きはこのパイプを回転半径としてポテンシヨメーターの軸をも回転させるので、手首の動きが円運動の一部として検出できる。捕球動作に支障のない大きさと形状をもつプラスチック製のホルダー（Fig. 3, Holder）が作製された。ホルダーとパイプとの連結部分には、手首の運動の

Fig. 3

際に生ずる可能性のある僅かな回転半径の変化に対応できるように、Linear Motion Bearing (Fig. 3, LMB) を使用した。ポテンシヨメーターにより導出した信号は、直流増幅器 (ダイヤメディカルシステム社製 DPA-100E の直流増幅部) で増幅し、動作曲線として前述のデータレコーダーに記録した。

第4節 筋電図の記録

捕球動作時の筋電図は、手首の屈曲に働く前腕の屈筋群から尺側手根屈筋、伸展に働く伸筋群から尺側手根伸筋を選び、表面電極 (直径 10 mm の日本光電社製銀塩化銀電極) を用いて双極導出した。電極は、各被験筋の筋腹上に筋線維の走行に沿って中心間距離 2.5 cm で貼付した。電極貼付の際は、電極間抵抗値を 50 K Ω 以下にするように、皮膚上を軽くサンドペーパーでこすりアルコール綿で拭いた後、電極糊を塗布した。尚、電極間抵抗値は貼付して 5 分後に値が安定したのを確認して

から前値として測定し、また実験の終了時にも測定し、変化していないことを確認した。このようにして各被験筋から導出された筋電図は、細胞外用高感度増幅器（ダイヤモンドイカルシステム社製 DPA-100E）により増幅され、手首の動きを示す動作曲線、ボールの落下開始時点を示す電気信号と同時にデータレコーダーに収録された。尚、増幅器の時定数は 0.001 秒であった。しかし、落下開始時点は本実験の分析の対象にはならなかった。これらの筋電図 (EMG) 及び動作曲線 (Wrist movement) の同時記録の 1 例を Fig. 4 に示す。

第 5 節 分析方法

(1) 捕球動作時の筋電図の分析

捕球動作時に出現する反射性筋放電を観察するため、平均加算法⁽²⁾⁽⁴³⁾が用いられた。平均加算法は、刺激により誘発される生理的現象を明確に観察しようとする時よく用いられる方法である。前述の第 4 節の方法により記録

された捕球動作時の筋電図は、直流増幅器（日本光電社製 AVB-10 の直流増幅部）により増幅され、誘発反応加算装置（日本光電社製 DAT-1100）を用いて、1 セット毎すなわち 50 回の筋電図が平均加算された。誘発反応加算装置を掃引するためのトリガーパルスは、データレコーダーに同時記録された手首の動きを示す電気信号における手首の伸展開始時に同期する電圧変化を用いた。平均加算装置で分析の対象となった時間は、トリガー後 200 msec であった。平均加算された波形（Fig. 4-B）は、オシロスコープ（日本光電社製 VC-10）に入れてポラロイドカメラ（キング万能接写装置 5R31A）を用いて写真撮影された。

Fig. 4-B に 50 回の捕球動作時の筋電図を平均加算した筋電図（Averaged EMG）の典型的な例を示した。

ボールを捕球する際の手首の伸展に伴う筋放電は、屈筋の Averaged EMG において、大きく二つに分離できる筋電図反応を生じた（Fig

. 4 - B , M 1 , M 2) 。 し か し 伸 筋 の A v e r a g e d E M G に
 お い て は 、 そ の よ う な 筋 電 図 反 応 を 認 め る こ
 と が で き な か っ た 。
 そ こ で 、 そ れ ら の 筋 電 図 反 応 の p e a k ま で の
 時 間 を 手 首 の 伸 展 開 始 か ら の 潜 時 と し て 測 定
 し た と こ ろ 、 そ の 最 初 の p e a k の 潜 時 は 約 2 5
 m s e c (2 4 . 8 ± 4 . 8 m s e c) で あ り 、 誘 発 筋 電 図 法
 に よ っ て 得 ら れ た H 反 射 の 潜 時 と 等 し い こ と 、
 ま た 屈 筋 に の み 認 め ら れ た こ と か ら 脊 髄 に お
 け る 単 シ ナ プ ス 性 の 伸 張 反 射 で あ る と 考 え た 。
 ま た 、 二 番 目 の p e a k の 潜 時 は 約 5 0 m s e c (5 2 . 9 ±
 8 . 3 m s e c) で あ り 、 単 シ ナ プ ス 性 の 伸 張 反 射 と
 し て 、 あ る い は 随 意 的 な 反 応 と し て は 考 え に
 く い 。 以 上 の 事 実 か ら 、 屈 筋 の A v e r a g e d E M G
 に 出 現 し た 最 初 の 筋 電 図 反 応 は L e e と T a t t o n ⁽⁴⁾
 に よ っ て 命 名 さ れ た M 1 、 二 番 目 の 筋 電 図 反
 応 は M 2 に 相 当 す る も の と 考 え た 。 本 論 文 で
 は 、 A v e r a g e d E M G に 見 ら れ た こ れ ら の p e a k を
 以 後 M 1 、 M 2 と い う 呼 称 を 用 い る こ と に し
 た 。

(2) 捕球動作時の手首の動きの分析

捕球動作の際、Fig. 4-Cの動作曲線において示されるように、落下してきたボールの衝撃により手首に受動的な伸展が生じる。これを分析するために二つのパラメーター（手首の伸展角度、最高伸展速度）を求めた。手首の伸展角度は、Fig. 4-Cにおいてベースラインから最大に伸展されたところまでの大きさを求め、最高伸展速度は、手首の角度変位を中心差分法⁵⁵⁾により微分して求めた。これらのパラメーターの分析のために、データレコーダーに記録された手首の動作曲線を示す電気信号は、A/D変換器（ダイヤモンドディカルシステム社製DPC-1200-AD、分解能12bit）を用いて、1kHzのサンプリング周波数でA/D変換し、パーソナルコンピューター（NEC社製PC-9801VM）で処理した。

第6節 誘発筋電図

(1) H反射の誘発及び記録方法

捕球動作を反復経験していく1シリーズの
 実験過程の中で、屈筋の α 運動ニューロンプ
 ールの興奮性の動態を調べるため、3名の被
 験者において、誘発筋電図法によりH反射が
 尺側手根屈筋から記録された。誘発筋電図の
 記録は捕球実験の試行系列に先だって(約12
 分)、Fig. 2に示されるように2回(Hc1, Hc
 2)の記録を行った。さらに捕球実験の各セ
 ットの終了後に誘発筋電図記録を組み込み(
 H1-H6)、第6セット終了後にも、捕球実験
 1セットに要する時間(約12分)を、
 誘発筋電図記録(H7)を行った。
 この際の被験者の姿勢は、捕球実験時と同
 様で、被験者には特に被験筋を収縮させるこ
 とのないように、また体を動かさないように
 指示した。
 誘発筋電図の導出のための電極は、捕球実
 験時と同一の電極が使用され、導出された筋
 電図は、細胞外用高感度増幅器により増幅さ
 れ、データレコーダーに収録された。尚、増

幅器の時定数は捕球実験時と同様に0.001秒とした。

刺激は、電気刺激装置（ダイヤモンドディカルシステム社製DPS-100）から矩形波（持続時間1 msec）をアイソレーター（ダイヤモンドディカルシステム社製DPS-110A）を通して加えられた。尺側手根屈筋においてH反射を導出するためには、その支配神経である尺骨神経を経皮的に電気刺激する必要がある。尺骨神経は肘部の上腕付近では比較的表層近くに位置しているので、一对の刺激電極を上腕肘部内側の皮膚上においた。陽極電極（日本光電社製銀塩化銀電極、直径10 mm）は上腕の内側二頭筋溝に沿ってその近位部に貼付され、刺激点となる陰極電極の貼付される位置が探査された。H反射が低い刺激強度でよく出現し、且つ被験者の疼痛感の少ない部位を適正な刺激点として選び、陰極電極が装着された。

本実験で使用した陰極電極は、当研究室で考案した、ステンレス製ボルトをプラスチック

ク製ブロックに頭部（直径12mm）のみ出して埋め込み、台部にマジックバンドを付け腕の周囲に巻き付けやすくしたものである。不関電極として16×5cmの長方形銀板を飽和食塩水を含ませたガーゼで覆い、導出電極と刺激電極の中間部に装着し接地した。尚、刺激の頻度は5秒に1回の頻度で行われた。

(2) H反射の同定及び分析方法

前述(1)の方法により得られた誘発筋電図の記録の例をFig. 5に示す。尺骨神経に対する刺激強度を上げていくと、刺激時点を意味するアーチファクトから25 msecの付近に活動電位が出現した (Fig. 5-A, 1, H)。刺激強度をさらに上げていくと、刺激時点から10 msecの付近に新たな活動電位が出現した (Fig. 5-A, 2, M)。さらに刺激を強くすると、最初の活動電位は刺激の増大に伴って増大したが、2番目の活動電位は減衰し (Fig. 5-A, 4)、やがて消失した (Fig. 5-A, 5)。そこでこれら二つの活動電位について潜時を測定すると、

M 波 の 振 幅 の 最 大 値 (M_{max}) は そ の α 運 動 ニ ュ
 ー ロ ン プ ー ル 内 の 全 て の α 運 動 ニ ュ ー ロ ン が
 興 奮 し た 場 合 の 筋 電 図 量 と 考 え ら れ る ³⁶⁾⁶⁰⁾ の で、
 H_{max} を M_{max} で 除 し た 値 ($H_{max} / M_{max} \text{ ratio}$) は、
 全 α 運 動 ニ ュ ー ロ ン に 対 す る 反 射 性 に 興 奮 し
 た α 運 動 ニ ュ ー ロ ン の 割 合 を 示 す も の で あ る。
 こ の $H_{max} / M_{max} \text{ ratio}$ に つ い て、 田 中 ⁶⁰⁾ は 異 な
 る 実 験 ・ 被 験 者 間 で の 定 量 的 比 較 を 行 う 上 で
 有 用 で あ る と 推 奨 し て い る。 そ こ で、 本 実 験
 に お い て も、 誘 発 筋 電 図 の 各 記 録 ($H_{c1} - H_7$)
 に お い て、 H 反 射、 M 波 の 最 大 値 及 び $H_{max} /$
 $M_{max} \text{ ratio}$ を 求 め た。 し た が っ て、 そ れ ら の
 値 を 求 め る た め に、 刺 激 強 度 は 段 階 的 に 変 え
 ら れ、 そ の 範 囲 は 約 10 - 50 V で あ っ た。

1	セ	ツ	ト	の	振	幅	を	コ	ン	ト	ロ	ー	ル	値	(	1	0	0	%	)	と	し	
て	第	2	セ	ツ	ト	以	降	の	各	セ	ツ	ト	の	振	幅	を	第	1	セ	ツ	ト	に	
対	す	る	相	対	値	(	百	分	率	)	と	し	て	求	め	、							
T	a	b	l	e	1	に	示	し	た	。	さ	ら	に	反	復	経	験	し	て	い	く		
過	程	に	お	け	る	M	1	、	M	2	の	振	幅	の	相	対	値	の	変	化	を	任	
意	の	3	名	の	被	験	者	に	つ	い	て	F	i	g	.	7	に	示	し	た	。	F	
い	く	傾	向	を	示	し	た	。	F	i	g	.	7	-	A	は	F	i	g	.	6	の	被
験	者	(	M	.	K	)	の	も	の	で	、	第	1	セ	ツ	ト	か	ら	第	6	セ	ツ	
ト	へ	と	経	験	を	積	む	に	つ	れ	て	、	M	1	は	増	大	す	る	傾	向	を	示
し	、	一	方	M	2	は	M	1	の	傾	向	と	は	対	照	的	に	減	少	し	て	い	く
傾	向	を	示	し	た	。	F	i	g	.	7	-	B	は	、	M	2	が	出	現	せ	ず	同
定	さ	れ	得	な	か	っ	た	被	験	者	の	一	例	で	、	M	1	の	振	幅	は	増	
大	あ	る	い	は	減	少	へ	の	一	定	方	向	へ	の	変	化	を	示	さ	な	か	っ	
た	。	F	i	g	.	7	-	C	は	、	M	1	、	M	2	と	も	減	少	し	て	い	
く	傾	向	を	示	し	た	例	で	あ	る	。	F	i	g	.	7	に	示	さ	れ	た	よ	う
な	経	験	を	積	ん	で	い	く	過	程	に	認	め	ら	れ	た	M	1	、	M	2	の	振
幅	の	変	化	の	傾	向	を	よ	り	明	確	に	検	討	す	る	た	め	に	、	そ	れ	ら
の	変	化	の	傾	向	を	増	大	傾	向	、	減	少	傾	向	、	変	化	な	し	の	三	つ
に	分	類	し	た	。	こ	こ	で	言	う	‘	増	大	傾	向	’							

とは、第1セットの値(100%)と比較してそれ以後のセットの値がすべて100%以上の値を示したものとした。また、'減少傾向'とは、第1セットの値と比較してそれ以後のセットの値がすべて100%以下の値を示したものとした。'変化なし'とは、増大傾向にも減少傾向にも当てはまらないもの、そしてたとえその変化がどちらか一方向への変化を示していたとしても第2セットから第6セットまでの5セットのうち3セット以上が±20%以上の変化を示さなかったものとした。

Table 2 は、上述の規準に従って10名の被験者の結果を表としてまとめたものである。

M1については、4名が増大傾向を示し、3名が変化なし、残りの3名が減少傾向を示し、

個人差が認められた。M2については、同定し得た5名の被験者のうち4名が減少傾向を示し、残りの1名が変化を示さなかった。

以上までの結果から、M1については、被験者全員に認められ、また経験を積むにつれ

△
Table 2

てその振幅が変動すること、その変動の傾向に個人差があることが示された。M2については、経験を積む前から認められないかまた認められたとしても経験を積むにつれてその振幅が減少していく傾向が強いことが示された。

第3節 M1、M2の変動と脊髄の α 運動ニューロンプールの興奮性との関係

捕球動作を反復経験していく1シリーズの実験過程の中で、屈筋の α 運動ニューロンプールの興奮性の動態を調べるため、3名の被験者において、実験方法の第6節の(1)に述べた方法によってH反射を記録し、実験方法の第6節の(2)に述べた解析法に従って、誘発筋電図の各記録(Hc1-H7)における H_{max}/M_{max} ratioを求めた。この H_{max}/M_{max} ratioは、さらにHc1をコントロール値(100%)としてそれ以降(Hc2-H7)の H_{max}/M_{max} ratioを相対値(百分率)として求めた。

Fig. 8

Fig. 8 は、ある一人の被験者 (M.K) の反復
 経験していく過程における M1、M2 の振幅
 の相対値の変動とともに H_{max} / M_{max} ratio の
 相対値の変化を示したものである。 $H_{max} /$
 M_{max} ratio は実験過程を通してほとんど変化
 していなかったことが認められた。同様の結
 果が H 反射の記録を行った他の 2 名の被験者
 についても認められた。したがって、捕球動
 作を反復経験していく過程において、屈筋の
 α 運動ニューロンプールの興奮性はほとんど
 変化していなく、本実験では M1 及び M2 の
 振幅の変動とは関係していなかった。

第 4 節 M1、M2 の出現及び変動と手首の
 動き (手首の伸展角度、最高伸展速度) との
 関係

捕球動作時の手首の動きに関する二つのパ
 ラメーター (手首の伸展角度及び最高伸展速
 度) を、実験方法の第 5 節の (2) に述べた分
 析方法に従って 4 名の被験者について求めた。

Table 3

さらにそれらの測定値からセット毎の平均値及び標準偏差を求め、Table 3 に示した。

Table 3-A は手首の伸展角度について、Table 3-B は最高伸展速度について示している。

手首の伸展角度の平均値は、Table 3-A に示されるように、各被験者が捕球動作を反復経験していく過程においてほとんど変化していなかった。また最高伸展速度の平均値も、Table 3-B に示されるように、反復経験していく過程においてほとんど変化していなかった。

そこで、M 1、M 2 の振幅の相対値の変動と手首の伸展角度及び最高伸展速度との関係を明確に見るため、Table 3 に示された4名の被験者のうち任意に選んだ2人の被験者について、反復経験する過程におけるM 1、M 2 の振幅の相対値の変動と、手首の伸展角度及び最高伸展速度の平均値と標準偏差の推移をFig. 9 に示した。Fig. 9-A の被験者は、

Fig. 9

Fig. 7-A, Fig. 8 と同一の被験者である。この
 被験者の手首の伸展角度と最高伸展速度は
 Fig. 9-A の上段に示されるようにほとんど変
 化していなかった。また Fig. 9-A の下段に示
 した M 1 の振幅の変化と Fig. 9-A の上段に示
 した手首の伸展角度及び最高伸展速度とは異
 なる変動のパターンを示していた。またこの
 ような関係は M 2 についても認められた。
 Fig. 9-B の被験者 (H. I) は、Table 2 に示
 した M 1、M 2 とともに減少傾向を示した者であ
 る。Fig. 9-B の被験者の場合においても、M
 1 及び M 2 の振幅が両方とも減少していく傾
 向を示したのに対して、手首の伸展角度及び
 最高伸展速度はこれらの変動と同様な変動の
 パターンを示さず、ほとんど変化していなか
 った。このような結果は、Fig. 9 に示さなか
 った他の 2 名の被験者においても同様に認め
 られた。したがって、M 1 及び M 2 の振幅の
 変動と手首の伸展角度及び最高伸展速度とは、
 本実験ではほとんど関係していなかったと結

論 じ れ た。

生 体 で 筋 伸 張 を 生 じ さ せ る に は 関 節 の 変 位
 が 必 要 で あ る。 こ れ に は 三 つ の 要 素、 す な わ
 ち 変 位 の 大 き さ、 変 位 の 速 度、 変 位 の 持 続 時
 間 (変 位 の 始 ま り か ら そ の 最 大 量 に 至 る ま で
 の 時 間) が あ る。 そ の 中 で も 特 に 持 続 時 間 が
 M 2 の 生 成 に 重 要 で あ る と 報 告 さ れ て い る。^{28/43)}
 手 首 の 伸 展 の 持 続 時 間 は 伸 展 の 速 度 が 一 定 の
 時 伸 展 の 大 き さ に よ っ て 決 定 さ れ る。 被 験 者
 H. T は、 T a b l e 2 に 示 す よ う に、 M 2 が 出 現
 し な か っ た 者 で あ る。 こ の 被 験 者 の 最 高 伸 展
 速 度 は T a b l e 3 - B に 示 さ れ る よ う に、 他 の M
 2 が 出 現 し た 被 験 者 の 値 と ほ と ん ど 同 様 で あ
 り、 伸 展 の 大 き さ す な わ ち そ の 角 度 も T a b l e
 3 - A に 示 さ れ る よ う に 同 様 で あ っ た。 し た が っ
 て 伸 展 の 持 続 時 間 も ほ と ん ど 同 様 で あ っ た と
 考 え ら れ る。 ま た 上 述 し た よ う に、 手 首 の 伸
 展 角 度 と 最 高 伸 展 速 度 は、 各 被 験 者 の 捕 球 動
 作 を 反 復 経 験 す る 過 程 を 通 し て ほ と ん ど 変 化
 し て い な か っ た の で、 伸 展 の 持 続 時 間 も ほ と

第 5 章 考 察

本実験では、被験者に捕球動作を課し、その際の手首の受動的な伸展により手首の屈筋に生じた反射性の筋電図反応について検討した。その結果として、捕球動作時の屈筋の筋電図を平均加算した Averaged EMG において、Lee と Tatton (1975)⁽²⁾ によって報告された M1、M2 に相当する反射性筋放電が出現していたことが観察された。さらに、結果の第2節に示したように捕球動作を反復的に実行し、経験を積むことによって M1 及び M2 の振幅が変動することが認められた。M1 の振幅については、その変動の傾向に個人差が認められた。一方 M2 の振幅については、経験を積むにつれて減少していく傾向が強いことが示された (Fig. 7, Table 2)。そこで、これらについて以下のような考察を試みた。

名の被験者の全員に認められたが、一方 M 2
 は 5 名の被験者においてのみ認められ、他の
 5 名については認められなかった。それでは、
 M 2 が被験者によって出現したりしなかった
 りしたのはどうしてであろうか。M 2 の生成
 については、刺激とされる伸展の持続時間（
 伸展開始からその最大量に至るまでの時間）
 が重要であるという報告がある。²⁸⁾⁴³⁾ Lee と
 Tutton (1982)⁴²⁾ は、M 2 の大きさは伸展の持続
 時間と関係し、その伸展の持続時間が 40 - 50
 msec 以内であると M 2 は出現せず、持続時間
 がそれ以上に増大していくと、M 2 が出現し
 その大きさが増大していったということを報
 告している。²⁸⁾ Ghez と Shinoda (1978) もまた、
 M 2 の生成に伸展の持続時間が影響し、その
 時間が 20 msec 以内では M 2 は出現せず、その
 時間を長くしていくと M 2 の大きさが増大さ
 れたと報告している。本実験では、Table 3
 に示したように、4 名の被験者において手首
 の伸展角度及び最高伸展速度が求められた。

被験者 H・I は M 2 が認められなかった例である。結果の第 4 節に述べたように、この被験者の手首の伸展角度及び最高伸展速度は、他の M 2 が出現した被験者の数値とほとんど同じであった。したがって、この被験者の手首の伸展の持続時間は、他の被験者のものとほぼ等しいと推測された。しかしながら、M 2 は一方では出現し、一方では出現しなかった。したがって、本実験では、M 2 の出現において、従来報告されているように伸展の持続時間がその要因ではないと考えられる。

Colebatch ら (1979)⁹⁾、Hammond (1956)³⁴⁾、Lee と Tatton (1975)⁴²⁾、Rothwell ら (1980)⁵⁷⁾ は、被験者に外乱に対する動作の指示を事前に与えた時、M 2 の大きさが修正されることを報告している。これらの報告において、M 2 の大きさは被験者がその外乱に対して "抵抗せよ" と指示され、そしてそのように対処した時、非常に大きくなり、また "従え" と指示された時に小さくなることが示された。すなわち、

外乱に對する意識の状態によつてM2の大き
 さが變化することが示された。これらの報告
 に従えば、被験者が落下してきたボールの衝
 撃によつて引き起こされた手首の伸展に如何
 に對処して捕球動作を行つたか、またその捕
 球動作時の意識の持ち方によつてM2の大き
 さが變化するものと予想することが出来る。
 すなわち、捕球動作が手首の伸展に抵抗する
 ような動作で行われる被験者では、M2がは
 っきりと出現し、逆に、その伸展にあえて抵
 抗しないような動作で捕球する被験者では、
 M2が出現しにくいということが考えられる。
 本実験では被験者に対して単に「ボールを
 強く把握せよ」という教示を与えた。落下し
 てきたボールの運動エネルギーにより引き起
 こされる手首の伸展は捕球動作の一連の過程
 の中で行われ、また被験者はその手首の伸展
 に対して特に意識していないと考えられる。
 したがつて、落下してきたボールによる手首
 の伸展に対しては各被験者が自由に對処し、

またその伸展に対する意識の持ち方も様々であつたと考えられる。M2の出現の状況が様々であつたという結果は、本実験での捕球動作が随意的で自由な活動状況下において行われたということを示唆するものであると考える。

第2節 反復経験によるM1、M2の変動について

Wolpawら(1983)⁶⁷⁾⁶⁸⁾⁶⁹⁾、Christakosら(1983)⁸⁾、

Meyer-Lohmannら(1986)⁵¹⁾は、サルにおいて、

M1及びM2の大きさが1日数百から数千回の練習を数カ月から数年間持続する長期間の練習によって変化していくことを報告している。彼らは、M1及びM2の大きさが変化し

たことは伸張反射の可塑性を示すものであると述べている。本実験においては、結果の第

2節に示したように、M1及びM2の大きさの反復経験による変動が認められたが、この事は、彼らが言う伸張反射の可塑性がヒトで

短時間で起こり得るということを示すものであるかもしれない。

(1) M1 について

結果の第2節に示したように、M1の振幅は、反復的に経験を積む過程において、変動するということ、またその変動のパターンには個人差があるということが認められた。

M1の振幅は、筋伸張の速度すなわち手首の変位の角速度と密接に關係することが Lee と Tutton (1982)⁴²⁾ によって報告されている。し

かしながら、本実験では、結果の第4節に示したように手首の伸展角度及び最高伸展速度は、捕球動作を300回行った過程においてほとんど変化していなかったにもかかわらず、M1の振幅が変動するという結果が示された。

したがって、M1の振幅の変動と伸展速度の關係は明確に示されず、本実験ではM1の振幅の変動を手首の伸展の速度から説明することはできなかつた。

M1は、脊髄における単シナプス性の伸張

反射として一般に考えられている。したがって、M1の振幅の変動は α 運動ニューロンプールに対する脊髄より上位の中樞の活動によって影響されたとの推測も可能である。すなわち、M1の振幅の変動のパターンに個人差が認められたのは、脊髄の伸張反射弓に対する上位の中樞の影響の様式が各被験者によって相違していたということが考えられる。もし脊髄より上位の中樞の活動が主働筋の α 運動ニューロンプールに対して影響を及ぼしているのならば、主働筋の α 運動ニューロンプールの興奮性にその影響が反映されるものと考えられる。そこで本実験では、結果の第3節に示したように、H反射を記録し、M1の振幅の変動と α 運動ニューロンプールの興奮性との関係を検討した。しかし、その結果においては、M1の振幅の変動と α 運動ニューロンプールの興奮性との間には関係がないと結論された。しかしながら、この点については再検討の余地があると思われる。というの

は、本実験では、H反射が捕球実験の各セッ
 トの終了後に記録されたので、本実験のH反
 射の結果は捕球動作遂行中の α 運動ニューロ
 ンプールの興奮性を反映するものではないか
 もしれないと思われる。したがって、今後、
 捕球動作を遂行している最中にH反射を記録
 し、再検討する必要があることが示唆された。
 以上考察したように、M1の振幅が反復経
 験によって変動したこと、またその変動のパタ
 ーンに個人差が認められたことにおいて、ど
 のような要因が最も強い影響要因になり得る
 かについては、現在の結果からは何とも言え
 ない。

(2) M2について

M2は、結果の第1節と第2節に示したよ
 うに、全く認められないか、認められたとし
 ても経験を重ねると減衰していく傾向を示し
 た。M2の出現について被験者間で差異が示
 されたことは、考察の第1節で述べたように
 本実験では、手首の伸展の持続時間がその要

因ではなく、落下してきたボールによる手首
 の伸展に対して被験者が自由に対処し、その
 伸展（外乱）に対する被験者の意識が様々で
 あると予測されたからと考えた。それでは、
 M2が経験を積む前の初期において認められ
 た被験者において、そのM2が減衰していっ
 たのは何故であろうか。前述したように、M
 2の大きさには、その刺激とされる伸展の持
 続時間が関係するという報告がある。²⁸⁾⁴³⁾ 本実験
 では、結果の第4節（Fig. 9, Table 3）で示
 したように、手首の伸展角度と最高伸展速度
 は、各被験者が捕球動作を反復経験していく
 過程においてほとんど変化していなかったの
 で伸展の持続時間もほとんど変化していない
 ものと考えた。したがって本実験では、M2
 の大きさの減少を伸展の持続時間から説明す
 ることはできなく、別の要因で生じるものと
 考えられる。
 その要因としては考察の第1節で述べたよ
 うに、被験者が外乱に対してどのような意識

を持ち、どのように対処して行ったかによる
 と考えることができる。すなわち、経験を積
 む過程で M 2 の大きさが変動したのは、落下
 してきたボールの衝撃により引き起こされた
 手首の伸展に対する被験者の意識また対応の
 仕方が変容したからではないだろうかと考え
 られる。前述したように、M 2 の大きさは被
 験者が外乱に対して事前に“抵抗せよ”と指
 示された時大きくなり、“従え”と指示され
 そのように対処した時小さくなることが報告
 されている。⁹⁾³⁴⁾⁴²⁾⁵⁷⁾これにしたがって M 2 の大き
 が経験を積むにつれて減少していったことを
 考えれば、経験を積むことによって被験者は
 その外乱に対して“抵抗する”という意識ま
 た対処の仕方から“従う”という意識また対
 処の仕方へとその捕球動作の内容を変容させ
 ていったのではないかという推測もできる。
 また文献考証の第 2 節で述べたように、M
 2 の生成に大脳皮質を必要とし、M 2 が大脳
 皮質経路の反射であると考えれば、¹⁰⁾¹¹⁾²³⁾²⁴⁾²⁶⁾⁴²⁾⁶¹⁾M 2 の大

大きさの変化は、経験を積む過程における大脳
 皮質の活動の変化を反映するものと考えられ
 る。したがって、経験を積むにつれてM2が
 減衰していったことは、M2を生成するの
 に関わった大脳皮質の活動が経験を積むにつれ
 て減少していったことを予想させる。

第3節 視覚情報を遮断した場合の反射性筋
 放電について

本実験では、捕球動作時に出現した反射性
 筋放電(M1、M2)が特に視覚情報を遮断
 した時にどのような様相を呈するかの点に
 ついても3名の被験者において検討した。こ
 の実験試行の場合、被験者は捕球動作時に
 目かくしをされ、ボールの落下状況を見るこ
 とができない状態で行われた。また、このよ
 うな遮眼条件での捕球動作は通常の捕球動作
 の試行系列がすべて終了した後に行われ、そ
 の際の実験方法は通常の捕球動作の実験方法
 と同様の方法で行われた。遮眼条件での捕球

動作は50回の試行のみで、それらについての
反復経験による影響は検討されなかった。

Fig. 10は、3名の被験者について、遮眼条
件での50回の捕球動作を平均加算し、その
Averaged EMGに出現したM1、M2の振幅を、
通常の捕球実験の第1セットの振幅をコント
ロール値(100%)として、その相対値として求
めたものである。

M1においては、Fig. 10に示されるように、
遮眼条件でのM1の振幅は、通常の捕球実験
の第1セットまた第6セットのものと比較し
て著しく小さかった。すなわち、遮眼条件で
のM1の振幅は、それより前に行われた通常
の捕球動作時のM1の反復経験による変動の
傾向にかかわらず、一様に小となることが認
められた。

一方、M2については、通常の捕球動作時
に認められなかった者(H.K, H.T)では遮眼
条件においても同様に認められなかった。ま
た、通常の捕球実験時において反復経験して

いく過程でその振幅が小となる傾向を示した
被験者 (H . N) の遮眼条件での振幅は、第 6
セットのものとの差はほとんどないが、第 1
セットと比較すれば、M 1 と同様に小さかつ
た。

以上の結果から、捕球動作時に出現する反
射性筋放電、特に M 1 の振幅は視覚情報の有
無によって影響されることが示された。しか
しながら、M 1 の振幅が視覚情報の有無によ
って影響されたことがどのような要因で生じ
たのかについては、現在の結果だけでは解明
できないので、今後さらに検討する必要があ
るものと思われる。

第 6 章 結 論

随意的で自由な活動状況下で行われる捕球動作時の手首の屈筋に、従来報告されていた M 1 と M 2 に相当する反射性筋放電が認められた。M 1 は被験者全員に認められたが、M 2 はその出現の状況に個人差があった。

捕球動作を反復経験することによって M 1 及び M 2 の振幅は変動した。M 1 の変動の傾向には個人差があったが、M 2 の振幅は経験を積むにつれて減少していく傾向が強いことが示された。以上の結果より、M 1 及び M 2 の生成に関わる神経系のメカニズムは可塑性を有することが示唆された。

第 7 章 要 約

- 1、 反 射 性 筋 放 電 が 捕 球 動 作 時 に 出 現 す る か
 ど う か を 検 討 す る た め、 落 下 し て き た ボ ー ル
 を 捕 球 す る 動 作 を 10 名 の 被 験 者 に 行 わ せ た。
 捕 球 の 際、 ボ ー ル の 衝 撃 に よ り 手 首 の 伸 展 が
 生 じ た。 こ の 捕 球 動 作 時 の 筋 電 図 を 前 腕 の 屈
 筋 及 び 伸 筋 よ り 表 面 電 極 を 用 い て 導 出 し、 平
 均 加 算 し た。
- 2、 平 均 加 算 さ れ た 屈 筋 の 筋 電 図 に お い て、
 連 続 し て い る 二 つ に 分 離 さ れ た 筋 電 図 反 応 が
 被 験 者 の 半 分 で 観 察 さ れ た。 そ れ ら の peak の
 潜 時 を 測 定 し た と こ ろ、 最 初 の peak は 約 25
 msec、 二 番 目 は 約 50 msec で あ り、 そ れ ら の 筋
 電 図 反 応 は 従 来 報 告 さ れ て い た M1、 M2 に
 相 当 す る も の と 考 え た。 M1 は 被 験 者 の 全 員
 に 認 め ら れ た。 M2 は 被 験 者 の 半 分 に の み 認
 め ら れ、 そ の 出 現 の 状 況 に 個 人 差 が あ っ た。
- 3、 M1 及 び M2 の 大 き さ が 捕 球 動 作 を 反 復
 経 験 す る こ と に よ っ て 変 化 す る か ど う か を 検
 討 す る た め、 捕 球 動 作 を 300 回 行 わ せ た。 そ

の結果、経験を積む過程において M 1 及び M
 2 の振幅が変動することが示された。M 1 の
 振幅の変動の傾向には個人差が認められた。
 M 2 の振幅は経験を積むにつれて減少してい
 く傾向が強いことが示された。

4、反復経験していく過程の屈筋の α 運動ニ
 ューロンプールの興奮性の動態を調べるため、
 数名の被験者において H 反射が記録された。
 その結果、屈筋の α 運動ニューロンプールの
 興奮性はほとんど変化していなく、本実験で
 は M 1 及び M 2 の振幅の変動とは関係してい
 なかった。

5、手首の動きに関するパラメーターとして、
 手首の伸展角度と最高伸展速度が数名の被験
 者について求められた。その結果、手首の伸
 展角度と最高伸展速度は、各被験者の反復経
 験していく過程でほとんど変化していなく、
 本実験ではこれらの伸展のパラメーターが M
 1 及び M 2 の出現及び変動の要因とは考えら
 れなかった。

6、以上の結果より、捕球動作時に反射性筋放電すなわち、M1及びM2が出現し、それらの振幅は反復経験することによって変化するごと、またそれらの生成に関わる神経系のメカニズムは可塑性を有することが示唆された。

謝 辞

稿を終るに臨み、御指導を賜った本大学体
 育学部生理学研究室石田絢子教授、並びに実
 験に際し終始御親切なる御指導、御示唆を下
 さった米田継武講師に深く感謝の意を表しま
 す。

併せて、本実験の被験者として御協力頂い
 た皆様に厚く御礼申し上げます。

引用文献

- 1) Allum, J.H.J. : Responses to load disturbances in human shoulder muscles: the hypothesis that one component is a pulse test information signal. Exp. Brain Res., 22: 307-326 (1975)
- 2) Bawa, P. & Tatton, W.G. : Motor unit responses in muscles stretched by imposed displacements of the monkey wrist. Exp. Brain Res., 37: 417-437 (1979)
- 3) Bulbulian, R. & Darabos, B.L. : Motor neuron excitability: the Hoffmann reflex following exercise of low and high intensity. Med. Sci. Sports Exerc., 18: 697-702 (1986)
- 4) Calancie, B. & Bawa, P. : Firing patterns of human flexor carpi radialis motor units during the stretch reflex. J. Neurophysiol., 53: 1179-1193 (1985)
- 5) Capaday, C. & Stein, R.B. : Difference in the amplitude of the human soleus H reflex during walking and running. J. Physiol., 392: 513-522 (1987)
- 6) Cavallari, P., Fournier, E., Katz, R., Pierrot-Deseilligny, E. & Shindo, M. : Changes in reciprocal Ia inhibition from wrist extensors to wrist flexors during voluntary movement in man. Exp. Brain Res., 56: 574-576 (1984)

- 7) Chan, C.W.Y., Melvill-Jones, G., Kearney, R.E. & Watt, D.G.D. : The 'late' electromyographic response to limb displacement in man. I. Evidence for supraspinal contribution. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol., 46:173-181(1979)
- 8) Christakos, C.N., Wolf, H. & Meyer-Lohmann, J. : The 'M2' electromyographic response to random perturbations of arm movements is missing in long-trained monkeys. Neurosci. Lett., 41:295-300(1983)
- 9) Colebatch, J.G., Gandevia, S.C., McCloskey, D.I. & Potter, E.K. : Subject instruction and long latency reflex response to muscle stretch. J. Physiol., 292:527-534(1979)
- 10) Conrad, B., Matsunami, K., Meyer-Lohmann, J., Wiesendanger, M. & Brooks, V. B. : Cortical load compensation during voluntary elbow movements. Brain Res., 71:507-514(1974)
- 11) Conrad, B., Meyer-Lohmann, J., Matsunami, K. & Brooks, V. : Precentral unit activity following torque pulse injections into elbow movements. Brain Res., 94:219-236(1975)
- 12) Crenna, P. & Frigo, C. : Excitability of the soleus H-reflex arc during walking and stepping in man. Exp. Brain Res., 66:49-60(1987)

- 1 3) Darton, K., Lippold, O. C. J., Shahani, M. & Shahni, U. : Long-latency reflexes in humans. J. Neurophysiol., 53:1604-1618(1985)
- 1 4) Delwaide, P. J. & Toulouse, P. : Jendrassik maneuver vs controlled contractions conditioning the excitability of soleus monosynaptic reflexes. Arch. Phys. Med. Rehabil., 61:505-510(1980)
- 1 5) Deschuytere, J., Rosselle, N. & Keyser, C. D. : Monosynaptic reflexes in the superficial forearm flexors in man and their clinical significance. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat., 39:555-565(1976)
- 1 6) Dietz, V. & Noth, J. : Pre-innervation and stretch responses of triceps brachii in man falling with and without visual control. Brain Res., 142:576-579(1978)
- 1 7) Dietz, V. & Noth, J. : Spinal stretch reflexes of triceps surae in active and passive movements. J. Physiol., 284:180-181P(1978)
- 1 8) Dietz, V., Noth, J. & Schmidtbleicher, D. : Interaction between pre-activity and stretch reflex in human triceps brachii during landing from forward falls. J. Physiol., 311:113-125(1981)
- 1 9) 藤森 聞一 : H波及びMonosynaptic reflex とその中枢機序に及ぼす諸要因, 脳と神経, 10:823-837(1958)

- 20) Eichenberger, A. & Ruegg, D.G. : Relation between the specific H reflex facilitation preceding a voluntary movement and movement parameters in man. J. Physiol., 347:545-559(1984)
- 21) Eklund, G., Hagbarth, K.E., Hagglund, J.V. & Wallin, E.U. : Mechanical oscillations contributing to the segmentation of the reflex electromyogram responses to stretching human muscles. J. Physiol., 326:65-77(1982)
- 22) Eklund, G., Hagbarth, K.E., Hagglund, J.V. & Wallin, E.U. : The 'late' reflex responses to muscle stretch: the 'resonance hypothesis' versus the 'long-loop hypothesis' J. Physiol., 326:79-90(1982)
- 23) Evarts, E.V. : Motor cortex reflexes associated with learned movement. Science, 179:501-503(1973)
- 24) Evarts, E.V. & Fromm, C. : Transcortical reflexes and servo control of movements. Can. J. Physiol. Pharmacol., 59:757-775(1981)
- 25) Evarts, E.V. & Tanji, J. : Gating of motor cortex reflexes by prior instruction. Brain Res., 71:479-494(1974)
- 26) Evarts, E.V. & Tanji, J. : Reflex and intended responses in motor cortex pyramidal tract neurons of monkey. J. Neurophysiol., 39:1069-1080(1976)
- 27) 藤原 哲司 : 筋電図マニュアル, 第1版. 67-71, 金芳堂: 京都(1985)

- 2 8) Ghez, C. & Shinoda, Y. : Spinal mechanisms of the functional stretch reflex. Exp. Brain Res., 32:55-68(1978)
- 2 9) Granit, R. : The basis of motor control. 264-276, Academic Press : London(1970)
- 3 0) Granit, R. : The purposive brain. 133-156, The MIT Press : Cambridge (1977)
- 3 1) Hagbarth, K. E., Young, R. R., Hagglund, J. V. & Wallin, E. U. : Segmentation of human spindle and EMG responses to sudden muscle stretch. Neurosci. Lett., 19:213-217(1980)
- 3 2) Hagbarth, K. E., Hagglund, J. V., Wallin, E. U. & Young, R. R. : Grouped spindle and electromyographic responses to abrupt wrist extension movements in man. J. Physiol., 312:81-96(1981)
- 3 3) Hammond, P. H. : Involuntary activity in biceps following the sudden application of velocity to the abducted forearm. J. Physiol., 127:23-25P(1954)
- 3 4) Hammond, P. H. : The influence of prior instruction to the subject on an apparently involuntary neuro-muscular response. J. Physiol., 132:17-18P(1956)

- 35) Hoffmann, P.A. : Beiträge zur Kenntnis der menschlichen Reflexe mit besonderer Berücksichtigung der elektrischen Erscheinungen. Arch. Physiol., 1910:223-246(1910)
- 36) Hugon, M. : Methodology of the Hoffmann reflex in man. New Developments in Electromyography and Clinical Neurophysiology, In Desmedt, J.E. ed., vol.3, :277-293(1973)
- 37) 笠井 達哉 : 脊髄の興奮性と反応時間の関係. 体育学研究, 25:95-104 (1980)
- 38) 笠井 達哉 : 下肢肢位変化による反応時間とH波の変動性. 体育学研究, 26:129-135(1981)
- 39) 川口 新一郎 & 渡辺 誠介 : 筋電図の検査法とその読み方(2) H波. 神経内科, 6:400-406(1977)
- 40) 久保田 競 : 随意運動メカニズムの特集にあたって. 神経研究の進歩, 28:3-6(1984)
- 41) Kuffler, S.W., Nicholls, J.G. & Martin, A.R. : From neuron to brain : a cellular approach to the function of the nervous system. 2nd ed. 105-109, Sinauer Associates Inc.: Sunderland(1984)

- 4 2) Lee, R.G. & Tatton, W.G. : Motor responses to sudden limb displacements in primates with specific CNS lesions and in human patients with motor system disorders. Can. J. Neurol. Sci., 2:285-293 (1975)
- 4 3) Lee, R.G. & Tatton, W.G. : Long latency reflexes to imposed displacements of the human wrist: dependence on duration of movement. Exp. Brain Res., 45:207-216(1982)
- 4 4) Liddell, E.G.T. & Sherrington, C.C. : Reflexes in response to stretch (myotatic reflexes). Proc. R. Soc. Lond., B. 96:212-242(1924)
- 4 5) Loo, C.K.C. & McCloskey, D.I. : Effects of prior instruction and anaesthesia on long-latency responses to stretch in the long flexor of the human thumb. J. Physiol., 365:285-296(1985)
- 4 6) Marsden, C.D., Merton, P.A. & Morton, H.B. : Stretch reflex and servo action in a variety of human muscles. J. Physiol., 259:531-560(1976)
- 4 7) Marsden, C.D., Merton, P.A., Morton, H.B., Rothwell, J.C. & Traub, M.M. : Reliability and efficacy of the long-latency stretch reflex in the human thumb. J. Physiol., 316:47-60(1981)
- 4 8) 松波 謙一 : 皮質経由の反射と随意運動. 神経研究の進歩, 28:47-57 (1984)

- 4 9) Matthews, P. B. C. : Mammalian muscle receptors and their central actions. Arnold: London (1972)
- 5 0) Matthews, P. B. C. : Evidence from the use of vibration that the human long-latency stretch reflex depends upon spindle secondary afferents. J. Physiol., 348: 383-415 (1984)
- 5 1) Meyer-Lohmann, J., Christakos, C. N. & Wolf, H. : Dominance of the short-latency component in perturbation induced electromyographic responses of long-trained monkeys. Exp. Brain Res., 64: 393-399 (1986)
- 5 2) Miller, A. D. & Brooks, V. B. : Late muscular responses to arm perturbations persist during supraspinal dysfunctions in monkeys. Exp. Brain Res., 41: 146-158 (1981)
- 5 3) Noth, J., Friedemann, H. H., Podoll, K. & Lange, H. W. : Absence of long latency reflexes to imposed finger displacements in patients with huntington's disease. Neurosci. Lett., 35: 97-100 (1983)
- 5 4) Noth, J., Podoll, K. & Friedemann, H. H. : Long-loop reflexes in small hand muscles studied in normal subjects and in patients with huntington's disease. Brain, 108: 65-80 (1985)
- 5 5) 大村 平: 微積分のはなし. 下, 第1版, pp. 221-245, 日科技連出版社 : 東京 (1972)

- 5 6) Phillips, C.G., Powell, T.P.S. & Wisendanger, M. : Projection from low-threshold muscle afferents of hand and forearm to area 3a of baboon's cortex. J. Physiol., 217:419-446(1971)
- 5 7) Rothwell, J.C. Traub, M.M. & Marsden, C.D. : Influence of voluntary intent on the human long-latency stretch reflex. Nature, 286:496-498 (1980)
- 5 8) Schieppati, M. & Crenna, P. : From activity to rest: gating of excitatory autogenetic afferences from the relaxing muscle in man. Exp. Brain Res., 56:448-457(1984)
- 5 9) Tanaka, R. : Reciprocal Ia inhibition during voluntary movements in man. Exp. Brain Res., 21:529-540(1974)
- 6 0) 田中 勵作: H反射-ヒトにおける神経生理学研究の一技法. 日本生理誌, 48:719-734(1986)
- 6 1) Tatton, W.G., Forner, S.D., Gerstein, G.L. Chambers, W.W. & Liu, C.N. : The effect of postcentral cortical lesions on motor responses to sudden upper limb displacements in monkeys. Brain Res., 96:108-113 (1975)
- 6 2) Toulouse, P. & Delwaide, P.J. : Reflex facilitation by remote contraction: topographic aspects. Arch. Phys. Med. Rehabil., 61:511-516 (1980)

- 6 3) Tracey, D.J., Walmsley, B. & Brinkman, J. : 'Long-loop' reflexes can be obtained in spinal monkeys. Neurosci. Lett., 18:59-65(1980)
- 6 4) Vilis, T. & Cooke, J.D. : Modulation of the functional stretch reflex by the segmental reflex pathway. Exp. Brain Res., 25:247-254(1976)
- 6 5) Wolpaw, J.R. : Reflexes capable of change: Models for the study of memory. Federation Proc., 41:2146(1982)
- 6 6) Wolpaw, J.R. : Change in short-latency responses to limb displacement in primates. Federation Proc., 41:2146(1982)
- 6 7) Wolpaw, J.R., Kieffer, V.A., Seegal, R.F., Braitman, D.J. & Sanders, M.G. : Adaptive plasticity in the spinal stretch reflex. Brain Res., 267:196-200(1983)
- 6 8) Wolpaw, J.R. : Adaptive plasticity in the primate spinal stretch reflex: reversal and re-development. Brain Res., 278:299-304(1983)
- 6 9) Wolpaw, J.R. : Adaptive plasticity in primate spinal stretch reflex: initial development. J. Neurophysiol., 50:1296-1311(1983)
- 7 0) Wolpaw, J.R. : Adaptive plasticity in the spinal stretch reflex: an accessible substrate of memory? Cell. Mol. Neurobiol., 5:147-165(1985)

- 7 1) Wolpaw, J.R. & O'Keefe, J.A. : Adaptive plasticity in the primate spinal stretch reflex: evidence for a two-phase process. J. Neurosci., 4: 2718-2724 (1984)
- 7 2) Wolpaw, J.R., O'Keefe, J.A., Noonan, P.A. & Sanders, M.G. : Adaptive plasticity in primate spinal stretch reflex: Persistence. J. Neurophysiol., 55: 272-279 (1986)

Reflex Muscle Discharges of Human Wrist
Flexors during Ball Catching Movements

Dai Yanagihara

Summary

The purpose of this study was to investigate the appearance of reflex muscle discharges of human wrist flexors during ball catching movements and the progressive influences of experience on the reflex muscle discharges.

Reflex activities of wrist flexors while catching a ball were studied by means of averaged surface EMG method. Impact force occurring when subjects caught the ball resulted in wrist extensions. Averaged EMG responses of flexor muscles in half of the subjects consisted of two successive segmented EMG activities. The first segment occurred with a peak latency of about 25 msec. The second segment occurred with a peak latency of about 50 msec. These segments were identified as M1 and M2 which have been reported in the previous study. M1 were observed in all of the subjects. However, M2 were observed in only half of the subjects.

Furthermore, to investigate the progressive influences of experience on M1 and M2, subjects performed 300 trials of the ball catching movement. The amplitudes of M1 and M2 changed with progressive experience. The changes of the amplitudes of M1 showed individual differences. The amplitudes of M2 decreased with progressive experience.

During the process of progressive experience, in order to study the change of excitability of the α -motoneuron pool of flexors, H-reflex was recorded for a few subjects. As a result, it was found that the excitability of the α -motoneuron pool was almost constant. That is, it was shown that the excitability of the α -motoneuron pool was not related to the changes of amplitudes of M1 and M2 in this study.

Angles and maximal velocities of wrist extension were calculated for a few subjects, as the parameters of wrist extension. Angles and maximal velocities were almost constant during the progressive experience. Therefore, in this study, these variables were considered not to be factors which affect the appearance or changes of M1 and M2.

From the consideration of the above results, it was suggested that M1 and M2 of reflex EMG responses would be affected by progressive experience and that their neural mechanisms possessed plasticity.

Fig.1 Schematic diagram of the experimental apparatus and recordings.

Fig.3 Experimental arrangement. Wrist extension was produced by the impact force of the fallen ball. EMG activities were recorded with surface electrodes over wrist flexors (Ef) and wrist extensors (Ee).

Fig.4 Typical records of raw EMG (A), averaged EMG of 50 trials (B) and wrist movement (C).

Fig.6 The change of averaged EMG responses (M1 and M2) of the wrist flexors occurring with progressive experience. Each trace (1st set - 6th set) is averaged EMG of 50 trials.

Fig.7 The changes of the amplitudes of M1 and M2 occurring with progressive experience in typical three subjects (A,B,C).

M2 was not distinguished for sub.H.T .

Fig.8 The changes of the amplitudes of M1 and M2, and of H max / M max ratio during the progressive experience.

Fig.9 The changes of the amplitudes of M1 (●) and M2 (○), and of angles (▲) and maximal velocities (■) of wrist extension during the progressive experience.

Fig.10 The effect of blindfold condition on the amplitudes of M1 and M2 in three subjects.

Table 1 Relative amplitudes (%) of M1 and M2.

Set Sub.		1	2	3	4	5	6
M. K	M 1	100.0	133.0	155.4	161.1	195.6	129.0
	M 2	100.0	77.7	70.8	77.5	53.6	60.9
Y. S	M 1	100.0	104.2	120.8	126.1	118.9	136.6
	M 2	100.0	82.2	97.9	63.1	58.5	61.4
H. N	M 1	100.0	143.5	200.6	162.7	275.4	220.7
	M 2	100.0	92.7	77.8	64.9	100.5	125.0
H. W	M 1	100.0	119.1	214.0	322.7	202.9	220.5
	M 2	*	*	*	*	*	*
H. K	M 1	100.0	126.2	77.8	130.5	88.9	83.5
	M 2	*	*	*	*	*	*
H. T	M 1	100.0	74.2	97.0	104.5	111.3	91.0
	M 2	*	*	*	*	*	*
T. Y	M 1	100.0	76.9	98.4	125.3	111.0	77.3
	M 2	*	*	*	*	*	*
H. I	M 1	100.0	67.5	52.7	65.8	51.0	49.8
	M 2	100.0	83.5	68.2	63.5	69.4	74.1
K. I	M 1	100.0	95.9	68.0	72.1	67.7	56.6
	M 2	*	*	*	*	*	*
T. S	M 1	100.0	67.3	52.4	33.9	49.4	31.5
	M 2	100.0	87.0	39.8	50.0	63.0	33.3

* : non-distinguishable

Table 3 Mechanical parameters of wrist extension in four subjects.

A : angles , B : maximal velocities.

Values are given as means $\pm$ SD (n=50).

A : angles (deg)

Set Sub.	1	2	3	4	5	6
H.I	15.7 $\pm$ 1.7	16.8 $\pm$ 3.0	16.2 $\pm$ 1.5	16.4 $\pm$ 2.3	16.3 $\pm$ 1.8	17.4 $\pm$ 1.6
M.K	17.2 $\pm$ 1.8	17.9 $\pm$ 2.5	18.7 $\pm$ 2.3	18.1 $\pm$ 2.3	17.7 $\pm$ 2.5	19.0 $\pm$ 2.1
H.N	18.5 $\pm$ 1.9	21.3 $\pm$ 2.6	21.9 $\pm$ 2.4	22.9 $\pm$ 2.1	23.2 $\pm$ 1.8	24.3 $\pm$ 2.4
H.T	19.8 $\pm$ 1.7	22.1 $\pm$ 2.3	22.9 $\pm$ 1.9	20.9 $\pm$ 2.1	21.8 $\pm$ 1.6	21.8 $\pm$ 2.2

B : maximal velocities (deg/sec)

Set Sub.	1	2	3	4	5	6
H.I	779 $\pm$ 95	725 $\pm$ 78	731 $\pm$ 109	797 $\pm$ 144	807 $\pm$ 178	805 $\pm$ 128
M.K	1067 $\pm$ 178	1068 $\pm$ 173	1064 $\pm$ 138	1033 $\pm$ 127	965 $\pm$ 126	1060 $\pm$ 144
H.N	1015 $\pm$ 140	1266 $\pm$ 226	1118 $\pm$ 182	1225 $\pm$ 138	1082 $\pm$ 107	1090 $\pm$ 108
H.T	1061 $\pm$ 173	1114 $\pm$ 116	1194 $\pm$ 118	1074 $\pm$ 103	1138 $\pm$ 122	1048 $\pm$ 113